

PROTOCOLE DE SOINS D'URGENCE

Elève concerné : Nom – Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Classe :

SIGNES D'APPEL :

- Essoufflement avec sifflement.
- Accès de toux qui se prolonge.
- Difficulté à respirer.
-

MESURES A PRENDRE :

- Isoler l'enfant, le calmer, le rassurer.
- Le laisser dans la position où il se sent le mieux (plutôt assis).
- Faire prendre le traitement suivant :

Agiter l'aérosol de

SOIT : - mettre dans la chambre d'inhalation bouffées de
- faire respirer l'enfant fois dans la chambre d'inhalation

SOIT : - aérosol de : introduire l'embout dans la bouche, expirer longuement, commencer une inspiration lente et profonde par la bouche, appuyer sur l'aérosol tout en continuant d'inspirer, retenir la respiration 10 secondes, puis expirer normalement.
- Recommencer aussitôt avec une 2^{ème} bouffée du produit.

Attendre minutes et recommencer ce traitement s'il n'y a pas d'amélioration.

S' il n'y a pas d'amélioration ¼ d'heure après le début de la crise et/ou si apparaissent des signes de gravité :

- l'enfant ne peut plus parler.
- l'enfant est agité et respire vite.
- l'enfant a les lèvres bleutées.
- l'enfant est agité, angoissé.

Appeler le SAMU : 15

EN ATTENDANT :

- Prendre la chambre d'inhalation.
- Y mettre 2 bouffées de **Ventoline**.
- Faire respirer 5 fois l'enfant dans la chambre.
- Attendre 5 minutes.
- Recommencer la même opération jusqu'à l'arrivée des secours.

Date et Signature du médecin traitant

Photocopier et remettre par la direction, en accord avec le médecin de l'Education Nationale et la famille, et faire signer à toute personne susceptible d'être confrontée à l'urgence (infirmière, professeur, administration,...).